


## // PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE INITIALE DES HÉMORRAGIES POST-PARTUM EN OBSTÉTRIQUE

INDICATEURS	Valeur CHU 2015	Valeur CHU 2017	Valeur nationale 2017	Comparaison Valeurs CHU et Nationale
-------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------


### MODALITÉ DE DÉLIVRANCE

Proportion de dossiers d'accouchement comportant la modalité de délivrance, la mention d'une administration préventive d'ocytocine, et pour les accouchements par voie basse, la conclusion de l'examen de placenta




### SURVEILLANCE MINIMALE EN SALLE DE NAISSANCE

Proportion de dossiers d'accouchement comportant la trace de surveillance clinique minimale, ainsi que la trace de l'examen médical autorisant la sortie de la salle de naissance



### PRISE EN CHARGE INITIALE DE L'HPPPI

Proportion de dossiers d'hémorragie post partum immédiat (HPPPI) comportant la trace de l'heure du diagnostic d'HPP, la quantification du saignement exprimée et en cas d'accouchement par voie basse la trace d'un geste endo-utérin réalisé au décours du diagnostic HPP




## // QUALITÉ DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS HÉMODIALYSÉS CHRONIQUES

INDICATEURS	Valeur CHU 2015	Valeur CHU 2017	Valeur nationale 2017	Comparaison Valeurs CHU et Nationale
-------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------


### SURVEILLANCE DU STATUT MARTIAL DU PATIENT TRAITÉ PAR AGENT STIMULANT L'ÉRYTHROPOÏSE (ASE)

Proportion de patients ASE+ pour lesquels, dans les 3 derniers mois, ont été réalisés un dosage de la ferritine et une deuxième mesure permettant d'évaluer le statut martial




### APPRÉCIATION DE L'ÉPURATION - PRESCRIPTION DE 3 SÉANCES ET 12 HEURES HEBDOMADAIRES

Proportion de patients ayant une prescription d'au moins 3 séances de dialyse d'une durée totale d'au moins 12 heures par semaine, au cours de la semaine analysée (en %)




### SURVEILLANCE NUTRITIONNELLE - STATUT NUTRITIONNEL

Proportion de patients pour lesquels une surveillance nutritionnelle datant de moins de 6 mois a été réalisée et comprend l'évaluation de 3 critères parmi les 4 suivants : l'Indice de Masse Corporelle (IMC), le dosage d'albumine (g/l), le calcul du nPCR, le pourcentage de la variation du poids sec dans les 6 derniers mois (en %)



### ÉVALUATION ANNUELLE DE L'ACCÈS À LA TRANSPLANTATION RÉNALE

Proportion de patients ayant une évaluation de l'accès à la transplantation rénale




## // PRISE EN CHARGE INITIALE DE L'ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC)

INDICATEURS	Valeur CHU 2015	Valeur CHU 2017	Valeur nationale 2017	Comparaison Valeurs CHU et Nationale
-------------	-----------------	-----------------	-----------------------	--------------------------------------


### EXPERTISE NEURO-VASCULAIRE

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d'AVC : taux de patients ayant bénéficié d'une expertise neurovasculaire




### ÉVALUATION PAR UN PROFESSIONNEL DE LA RÉÉDUCATION

Taux de patients ayant eu une évaluation par un professionnel de la rééducation




### DÉPISTAGE DES TROUBLES DE LA DÉGLUTITION

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic AVC : Taux de patients ayant eu un dépistage des troubles de la déglutition



### PROGRAMMATION D'UNE CONSULTATION POST-AVC

Pour les patients hospitalisés avec un diagnostic d'AVC : Taux de patients ayant une consultation avec un médecin de la filière AVC programmée dans les 6 mois suivant sa sortie de court séjour



Ces indicateurs sont issus d'une démarche coordonnée par le Ministère de la Santé et la Haute Autorité de Santé. Les résultats sont affichés sous forme de pourcentage de dossiers conformes.